

# UWAGA!

## JEŻELI PO POSIŁKU / PODANIU LEKU / UŻĄDLENIU GWAŁTOWNIE POJAWIĄ SIĘ


- » POKRZYWKA
- » SILNY ŚWIĄD CAŁEGO CIAŁA
- » NAPAD KASZLU
- » OBRZĘK W GARDLE
- » OBRZĘK JĘZYKA
- » DUSZNOŚĆ
- » ŚWISZCZĄCY ODDECH
- » BRAK KONTAKTU
- » UTRATA ŚWIADOMOŚCI

TO MOŻE BYĆ **ANAFILAKSJA**

**POMÓŻ**

**MOŻESZ URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE**

- 1 POŁÓŻ CHOREGO I PODNIĘŚ JEGO NOGI KU GÓRZE
- 2 GŁOŚNO WOŁAJ O POMOC
- 3 ZADZWOŃ **112** LUB **999**
- 4 JEŻELI CHORY MA PRZY SOBIE ADRENALINĘ...



PODAJ MU DOMIĘŚNIOWO **ADRENALINĘ**

**W PRZEDNIO-BOCZNĄ POWIERZCHNIĘ UDA W JEGO 1/3 GÓRNEJ CZĘŚCI**

PO PODANIU ADRENALINY NALEŻY BEZWZGLĘDNI WEZWAĆ DO PACJENTA ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

### ADRENALINA WE WSTRZYKIWACZU

- » Chwyć wstrzykiwacz tak, aby dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza, a pomarańczowa końcówka była skierowana w dół
- » Drugą ręką zdejmij niebieskie zabezpieczenie
- » Trzymaj pomarańczową końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie uderz mocno w udo (usłyszysz kliknięcie)
- » Przytrzymaj wstrzykiwacz 5 sekund przy udzie, a następnie odciągnij na bok
- » Rozmasuj miejsce wstrzyknięcia



### ADRENALINA W AMPUŁKOSTRZYKAWCE

- » Zdejmij nasadkę igły
- » Nie zdejmuj blokady na tłoku
- » Wbij igłę w udo
- » Nie podawaj przez ubranie (wyjątek: można podać przez cienką tkaninę)
- » Naciskaj tłok do czasu, aż poczujesz opór
- » Wyjmij igłę
- » Rozmasuj miejsce wstrzyknięcia

